

Operation med fjernelse af børne-polypper

Polypper i næsesvælget kan give problemer med nedsat luftpassage gennem næsen, snorken og væske i mellemøret.

Indgrebet

Barnet skal være fastende, og operationen foregår i fuld bedøvelse.

Indgrebet foretages gennem munden og tager cirke 20 minutter.

Efter operationen

Inden i forlader klinikken, kontrolleres mund og næse for blødning. Det er normalt, at der er en smule gammelt blod i spyt og snot på operationsdagen og dagene efter.

Blødning er en sjælden, men kendt komplikation. Hvis der opstår kraftig frisk blødning, skal det tages meget alvorligt. Vi anbefaler derfor, at barnet i det første døgn efter operationen sover i samme rum som en voksen.

I tilfælde af kraftig frisk blødning fra næse eller mund skal I med det samme ringe 112 og oplyse at barnet er blevet opereret og nu bløder.

Det anbefales at spise kølig og blød kost det første døgn efter operationen.

Barnet skal passes hjemme af en voksen på selve operationsdagen samt dagen efter.

Smertestillende

Det er normalt at have lette smerter i halsen og på tungen efter operationen.

Der kan komme lidt feber, vanligvist op til 38,5 grader det første døgn.

Vi anbefaler, at I giver barnet Panodil efter vægt, såfremt I har indtryk af smerter hos barnet (gråd, manglende lyst til at spise og drikke mm.).

Som regel aftager smerterne i løbet af det første døgn.

Kontrol

Der planlægges kontrol efter indgrebet for at vurdere effekten. Børne-polypper kan vokse ud igen.