

## Operation med reduktion af mandlerne

Forstørrede mandler hos børn, kan medføre spisebesvær, vejrtrækningsproblemer, snorken og pauser i vejrtrækningen under søvn.

### Indgrebet

Barnet skal være fastende, og operationen foregår i fuld bedøvelse. Indgrebet foretages gennem munden og tager ca. 30 minutter. Når barnet sover, anlægges hos nogle mindre børn et lille venflon (plastikrør) i håndryggen, så der evt. kan gives væske eller medicin her.

### Efter operationen

Inden i forlader klinikken, kontrolleres mund og næse for blødning, og venflon fjernes fra håndryggen.

Blødning er en sjælden, men kendt komplikation. Hvis der opstår kraftig blødning, skal det tages meget alvorligt. Barnet skal derfor i det første døgn efter operationen sove i samme rum som en voksen.

I tilfælde af kraftig frisk blødning fra næse eller mund skal I med det samme ringe 112 og oplyse, at barnet er blevet opereret i mandlerne.

Det anbefales at spise kølig og blød kost det første døgn efter operationen. Herefter må barnet spise og drikke, hvad det har lyst til.

Barnet skal passes hjemme af en voksen i én uge efter operationen, hvor barnet skal holde sig i ro derhjemme. Desuden skal barnet ikke deltage i idræt, svømning eller anden hård aktivitet i 14 dage efter operationen.

Andre ting, der er forventeligt efter operationen: Dårlig ånde, savlen, spytklud, ændret smagssans i en periode.

### Smertestillende

Det er normalt at have smerter i halsen og på tungen efter operationen.

Der kan komme lidt feber til omkring det 38.5° det første døgn.

1. døgn: Panodil og Bonyl efter vægt 4 gange dagligt (skal gives sammen)

2. – 4. døgn: Panodil efter behov, højst 4 gange dagligt. Nogle børn har fortsat behov for bonyl og det gives så sammen.

## Kontrol

Der planlægges kontrol efter indgrebet for at vurdere effekten. Mandler kan i sjældne tilfælde vokse ud igen.